


MEDIDAS ANTE CONVULSIÓN

- **SIGNOS:** el tutor/a debe conocer el "aura" (si existe) que precede a la aparición de la convulsión.

- **ACTUACIÓN:**



1. Asistir a colocarse en **POSICIÓN HORIZONTAL** si pierde el conocimiento, y quedarse con el niño/a durante y después del ataque (anotar la **DURACIÓN Y EL TIPO** de movimientos del cuerpo durante el mismo)
2. Colocar algo suave y aplastado **BAJO LA CABEZA**
3. Quitarle las gafas, AFLOJAR la ropa alrededor del cuello y cintura. "**LIMPIAR LA ZONA**", evitando que se golpee con los objetos que le rodean.
4. Mantenerle tumbado y colocarlo en **DECÚBITO LATERAL** en cuanto se pueda
5. Si el alumno o la alumna está diagnosticado de crisis febriles o de epilepsia, administrar **MICROENEMA RECTAL** (Stesolid®, dosis según indicación médica)
6. Tras la crisis, dejarle DESCANSAR y hasta que la recuperación de la conciencia no sea completa, mantener al afectado en decúbito lateral y asegurar la vía aérea

- **NO INTENTAR LEVANTAR, SENTAR O SUJETAR AL ALUMNO/A DURANTE LA CRISIS**
- **NO INTRODUCIR OBJETOS EN LA BOCA**
- **NO OFRECERLE ALIMENTO O BEBIDA HASTA QUE HAYA RECOBRADO COMPLETAMENTE LA CONCIENCIA**
- **LLAMAR A URGENCIAS Y A LOS PADRES**